

JUNONIA LAOMEDIA Lin.

— ASTERIA Lin.

— ORYTHYA Lin.

— ALMANA Lin.

ARGYNnis NIPHE Lin.

DANAIS PLEXIPPUS Lin.

— SIMILIS Lin. (*aventia*, Cram.).

EUPLOEA GODARTII Boisd.

— BURMEISTERI Boisd.

MELANITIS LEDA Lin.

#### Hyménoptères.

XYLOCOPA DISSIMILIS Lep.

POLISLES HEBRÆUS F.

— SAGITTARIUS H. de Sauss.

— SCHACH F.

#### Hémiptères.

SCUTELLERA NOBILIS Fabr.

DYSDERCUS CINGULATUS Fabr. Très abondant sur les Cotonniers; mais ne paraît causer aucun dégât.

BELOSTOMA INDICUM Lep. et Serv. Très abondant dans les mares et les arroyos. Les indigènes le coupent en morceaux très fins et les mêlent à la saumure de Poissons, à laquelle, paraît-il, ils communiquent une odeur très agréable.

PHYMA IMITATA. Il n'en existe qu'un seul exemplaire dans les collections du Muséum. La larve se recouvre d'un épais duvet blanchâtre. Les Jujubiers, en particulier, sont très souvent envahis par ces Insectes qui les amènent à un état de dépérissement général. Les bassinages à l'eau additionnée de jus de tabac suffisent pour la destruction de ce parasite.

---

DESCRIPTIONS D'ARACHNIDES NOUVEAUX DE MADAGASCAR,  
FAISANT PARTIE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM,

PAR M. E. SIMON.

**Myrtale Alluaudi**, nov. sp. — ♀ long. 5 millimètres.

Cephalothorax fusco-piceus, reticulatus et nitidus, fovea tubere oculorum paulo angustiore, leviter recurva, tenui sed utrinque leviter ampliata, sulco medio brevissimo. Oculi quatuor antici inter se subæquales. Oculus lateralis posticus antico vix minor. Oculus medius posticus reliquis minor, a laterali postico contiguus. Pars labialis spinulis acutis 5 vel 6 iniquis et inordinatis munita. Coxa

pedum-maxillarium aculeis similibus 10-12, vittam angustam, apicem attingentem, designantibus, armata. Abdomen nigrum, subtus dilutius, granulis setiferos conspersum. Chelæ fulvo-rufulæ, læves et glabrae, sed intus setis spiniformibus uniseriatis munitæ. Partes oris sternumque fulva et nitida. Pedes fusco-olivacei, femoribus dilutioribus, antici aculeis validis, ut in *M. Perroti* ordinatis, armati. Ungues graciles, ad basin dentibus binis geminatis armati. — Fort-Dauphin (C. Alluaud, 8, XI).

**Emplesiogonus scutulatus**, nov. sp. — ♂ long. 2,5 millim.

Cephalothorax antice albo-testaceus, utrinque atque ad marginem fusco-variatuſ et macula media magna nigro-castanea subtrapeziformi, linea tenui alba divisa, notatus, postice nigro-castaneus, utrinque ad angulum tuberculis parvis binis albis armatus, subtiliter rugosus et albido-pilosus. Abdomen breve, supra duriusculum, fulvum, antice utrinque late albo-marginatum, postice transversum albo-striatum et utrinque leviter infuscatum, subtus fusco-testaceum. Chelæ nigrae, antice albo-maculatae. Partes oris sternumque nigra. Pedes breves, pallide flavi, subpellentes, minutissime fusco-variati. Pedes-maxillares breves, pallide flavi, tibia tarsoque fusco-castanei, patella parva convexa, tibia patella breviore sed latiore, apophysi magna, articulo longiore, recta et conica, extus armata, tarsus ovato, bulbo simplici, convexo. — Sinus *Antongil* dictus (Mocquerys).

**Plastonomus**, nov. gen.

Ab *Emplesiogono* differt cephalothorace fere æque longo ac lato, subquadrato, postice quum antice vir angustior, crasso sed superne plano et minute bimpresso, clypeo oculis lateralibus anticis non multo latiore, area oculorum mediorum circiter triplo latiore quam longiore, abdomine late ovato, paulo longiore quam latiore, antice truncato, superne fere plano, late sigillato.

**P. octoguttatus**, nov. sp. — ♀ long. 4 millimètres.

Cephalothorax niger, ad marginem clypei leviter ferrugineus, crebre impresso-punctatus atque in medio minute biimpressus. Abdomen supra duriusculum et nitidum sed sigillis coriaceis maximis ovatis binis impressum, nigerrimum, maculis luteo-testaceis biseriatis (4-4), 2<sup>is</sup> reliquis minoribus, supra ornatum. Chelæ valde coriaceæ, partes oris, pedes-maxillares, sternumque nigra. Pedes breves et robusti, quatuor antici nigri, metatarsis tarsisque fulvo-rufulis, coxis femoreque 2<sup>i</sup> paris ad basin pallide luteis, pedes postici lutei, femoribus ad apicem patellis tibiisque fusco-variatis et subvittatis. — Regio Mahafaly (Bastard 1900).

**Apyre nigra**, nov. sp. — ♀ long. 3 millimètres.

Cephalothorax crassus, antice parum attenuatus, vix angustior a margine clypei quam postice, valde sinuoso-rugosus, antice, inter oculos, area parva longitudinali latiore, linea tenui rugosa divisa, notatus, utrinque tuberculis parvis trinis longissime setiferis, ad marginem posticum truncatus atque in medio obtuse excisus, tuberculis setiferis contiguis 12 ornatus. Oculi laterales utrinque parum prominuli, posticus ad angulum posticum quam ad angulum clypei vix remotior.

Abdomen breve, coriaceum, parce et longissime setosum, nigro-opacum, interdum concolor, interdum postice late fulvo-marginatum. Chelæ, partes-oris, sternum, pedes-maxillares pedesque nigro-castanea, femoribus quatuor posticis pallide luteis. Plaga genitalis magna, fulva et nitida, rotunda, carinula longitudinali temui, antice divisa. — Tamatave (Camboué), Antongil (Mocquerys).

**A. catenulata**, nov. sp. — ♂ long. 2 millimètres.

Cephalothorax crassus, a margine clypei quam a margine postico angustior, niger, valde sinuoso-rugosus, cancellatus, antice, inter oculos, area parva longitudinali lœviore, linea tenui rugosa divisa, notatus, utrinque tuberculis trinis (posticis majoribus), ad marginem posticum tuberculis minoribus seriatis, aculeos fulvos validos gerentibus, armatus. Oculi laterales postici sat prominuli ad angulum clypei quam ad angulum posticum paulo remotiores. Abdomen breve, supra nigrum, parce setosum, utrinque vitta lata alba, valde recurva semicirculari et divisa, ornatum, subtus luteo-testaceum. Chelæ nigrae. Partes oris sternumque castanea. Pedes breves, flavidi, coxis infuscatis, femoribus 1<sup>i</sup> paris antice macula submedia transversa fusca notatis. Pedes-maxillares breves, olivacei, tarsو flavidо, tibia patella breviore transversa, tarsо ovato, bulbo simplici. — Antongil (Mocquerys).

**A. quinquenotata**, nov. sp. — ♂ long. 2 millimètres.

Cephalothorax nigro-castaneus, prope oculos intense niger, fere præcedentis sed postice tuberculis setiferis seriatis paucioribus (8) munitus. Abdomen breve, parce et longe setosum, supra nigrum, antice maculis binis ovatis longitudinalibus, prope medium maculis magnis binis ovatis et transversis inter se remotioribus maculaque minore apicali albis, ornatum, subtus fusco-testaceum. Chelæ, partes oris sternumque nigra. Pedes flavidо-rufuli, femoribus dilutioribus sed utrinque ad apicem, præsertim postice, nigro-notatis, tibiis rufulo-variegatis et subannulatis. Pedes-maxillares fere præcedentis sed nigricantes. — ♀ long. 2-5 millimètres. Pedum patellæ tibiæque cunctæ nigricanti-notatae. Pedes-maxillares fusco-castanei. — Antongil (Mocquerys).

**A. tessera**, nov. sp. — ♀ long. 2-3 millimètres.

Cephalothorax nigro-rufescens, postice, in declivitate intense niger, grosse granulosus, macula media longitudinali parva flavo-nitida et utrinque, proprie oculos posticos, tuberculis fulvis parvis 4 vel 5 notatus, ad marginem posticum aculeis subpellucentibus sat brevibus seriatis 16-18 armatus. Abdomen valde convexum, latius quam longius, pallide flavescens, antice macula parva longitudinali triquetra, dein arcu parvo, postice vitta transversa latissima, in medio interrupta, nigra, notatum, subtus nigro-marginatum. Chelæ fusco-rufulæ, ad basin rugosæ. Partes oris sternumque nigra. Pedes breves, quatuor antici fulvo-rufuli, femoribus nigris, quatuor postici lutei, tibiis infuscatis et rufulis, femoribus 1<sup>i</sup> paris apice fuscis. — Fort-Dauphin (Ch. Alluaud).

**Xysticus hepaticus**, nov. sp. — ♀ long. 7 millimètres.

Cephalothorax fusco-rufescens, parte thoracica utrinque late luteo-testacea,

inordinate olivaceo-guttulata vel clathrata, subtiliter coriaceus, pilis fulvis brevibus obtusis et subclavatis parce vestitus et setis nigris spiniformibus paucis conspersus, margine clypei in medio setis spiniformibus 4 et utrinque seta simili angulari armato. Oculi medii postici a lateralibus quam inter se multo remotiores. Area oculorum mediorum antice quam postice paulo latior et saltem haud latior quam longior. Abdomen vix longius quam latius, antice obtuse truncatum, postice ampliatum atque obtusum, supra fusco-opacum, pilis obtusis fulvis aculeisque sat brevibus nigris conspersum, subtus dilutius. Chelæ fulvæ, subtilissime transversim rugatæ atque ad basin setis spiniformibus paucis munitæ. Partes oris sternum coxaeque pallide lutea, pars labialis sternumque ad marginem leviter infuscata. Pedes robusti, obscure fulvo-olivacei, leviter maculati, metatarsis tarsisque dilutioribus, pilis claviformibus fulvis, aculeisque nigris robustis et numerosis armati, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus saltem 5-5 et utrinque aculeis lateralibus minoribus binis armatis. Plaga genitalis fulvo-rufula, longior quam latior, antice rotunda, in medio valde constricta, postice transversim striata.

— Antongil (Mocquerys).

**Herbessus**, nov. gen.

Ab *Heriae*, cui affine est, differt ab domine, saltem feminæ, antice obtuso, postice ampliato, truncato atque anguloso, pedibus quatuor anticis maris tibia inflata, longe claviformi et breviter pediculata, supra convexa et nitida, subtus longe et crebre nigro-fimbriata, metatarso tarsoque gracillimus rectis et muticis, pedibus feminæ fere *Heriae* sed brevioribus.

**Herbessus Deorcei**, nov. sp. — ♂ long. 4 millimètres.

Cephalothorax fusco-rufescens, vitta media lata fulvo-rufula, postice sensim attenuata et albido-variegata notatus, fere lœvis sed spinis erectis, in parte cephalica lineas tres longitudinales, in thoracica lineas radiantes numerosas designantibus et versus marginem sensim longioribus echinatus, tuberibus ocularibus albo-opacis, margine clypei setis spiniformibus 8, duabus reliquis multo longioribus, munito. Abdomen longius quam latius, postice leviter ampliatum, antice posticeque obtuse truncatum, supra fulvum, in parte basali nigro-reticulatum et vitta media alba, apice lanceolata, ornatum, in parte altera dilutius et maculis transversis albis trinis, media minore, vittam recurvam designantibus, notatum, aculeis gracilibus erectis inquis, postice densioribus, echinatum, subtus fulvo-testaceum, regione epigasteris magna rufula. Chelæ fulvæ, fusco-punctatæ. Partes oris sternumque fulva, nitida. Pedes quatuor antici reliquis multo robustiorcs, femoribus fulvis, antice valde fusco-rufulo-variatis et subannulatis, patellis tibiisque fusco-castaneis vel nigris, nitidis, sed tibia 2<sup>i</sup> paris annulo basali luteo notata, metatarsis tarsisque luteis supra tenuiter fusco-lineatis, femoribus compressis, aculeis erectis numerosis ad basin bulbosis, supra longis, utrinque et subtus parvis, armatis, patellis convexis supra spinosis, tibiis muticis nitidis, ad basin depressis, ad apicem valde ampliatis et claviformibus, seti nigris longissimis subtus crebre fimbriatis, metatarsis tarsiisque longissimis et gracillimis, metatarsis setis longissimis et divaricatis biseriatis munitis. Pedes postici pallide lutei, fusco-rufulo maculati et subannulati, spinis inquis conspersi. Pedes-maxillares breves, fulvi, femore patellaque ad apicem albo-cinctis, femore subtus

nigro-notato, tibia obscuriore brevi, apophysi longa, secundum tarsum directa cylindracea et recta sed apice minute nigra et uncata extus armata, tarse rufulo-punctato, bulbo magno, simplici et convexo.

♀ Long., 4-5 millimètres. — Cephalothorax fulvus, pilis crassis erectis albis conspersus, parte cephalica antice infuscata, utrinque late rufulo-marginata, thoracica in medio fusco-reticulata. Abdomen paulo longius quam latius, antice obtusum, postice ampliatum et truncatum cum angulis prominulis, supra obscure cinereum, postice in declivitate albido, tuberculis parvis setiferis fulvis conspersum, subtus pallide luteum. Chelæ fulvae, rufulo-punctatae, antice spinosæ. Partes oris, sternum coxaeque pallide lutea, levia et nitida. Pedes fulvi, præsertim antici rufulo-atomarii, setis spiniformibus albidis, singulariter elevatis, conspersi, tibiis anticis nec inflatis nec fimbriatis, subtus cum metatarsis seriatim aculeatis. — Ambovombe, Morozano, Ankrafontsy (Decorse, 1901).

**Phrynarachne clavigera**, nov. sp. — ♀ long. 3 millimètres.

Cephalothorax nigellus, vitta media paulo dilutiore et rufula, confusa et antice evanescente notatus, coriaceus, antice et in lateribus tuberculis parvis iniquis et inordinatis munitus, in medio levior sed linea minute tuberculata sectus, margine clypei tuberculis seriatim contiguis, aculeos clavatos gerentibus, munito. Oculi medii aream evidenter latiorem quam longiorem occupantes, antici posticis paulo majores. Oculi medii antici lateralibus minores et a lateralibus quam inter se vix remotiores. Abdomen paulo latius quam longius, antice late truncatum, utrinque et postice rotundum, opacum, fusco-testaceum, leviter et confuse fusco-variatum, pilis flavidis minutissimis conspersum et sigillis nigris, posticis magnis et ovatis, impressum. Pedes brevissimi, quatuor antici robustissimi, nigricantes sed leviter rufulo-variati, tarsis fulvis, femoribus patellis tibiis metatarsisque tuberculis iniquis, fere inordinatis, spinas claviformes gerentibus, ornatis, tibiis aculeis inferioribus longis suberectis 2-2, ad basin singulariter elevatis, fulvis sed apice nigris, metatarsis aculeis similibus 3-3 subtus armatis, sed aculeis lateralibus parentibus. — Tamatave, Antongil.

**P. pusiola**, nov. sp. — ♀ long. 2 millimètres.

Cephalothorax obscure testaceus, postice, in declivitate, niger, parte cephalica fusco-rufula, testaceo-variegata, thoracica utrinque parce fusco-reticulata, vittis dorsalibus binis nigricantibus, extus valde laciniosis, notata, coriaceus, haud tuberculatus sed pilis flavidis nitidis brevibus squamiformibus et ovalis vestitus, margine clypei spinis claviformibus sat longis uniseriatis munito. Oculi medii parvi, inter se subæquales, aream circiter æque longam ac latam occupantes. Oculi medii antici lateralibus paulo minores et a lateralibus quam inter se remotiores. Abdomen fere præcedentis sed fulvum, sigillis minoribus impressum, pilis flavidis minutissimis, pilis claviformibus nigris majoribus mixtis, vestitum. Pedes fere præcedentis sed femoribus fulvis fusco-variatis, anticis leviter nodosis et tuberculis nigris binis ornatis, reliquis articulis haud tuberculatis, pilis squamiformibus fulvis vestitis, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus 3-3, longioribus et acutioribus, munitis. — Antongil (Mocquerys).

**Donuea**, nov. gen.

A. *Corinommati*, cui affine est, differt cephalothorace ovato fere *Castaneiræ*, oculis mediis, præsertim anticis, a lateralibus quam inter se multo remotioribus, pedibus anticis posticis multo longioribus et imprimis parte labiali evidenter longiore quam latiore fere *Corinnae*. A. *Castaneira* pedibus anticis, parte labiali, oculis anticis in lineam rectam atque inter se æquilibus, abunde differt.

**D. Decorsei**, nov. sp. — ♂ long. 9 millimètres.

Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, regione frontali infuscata, parte thoraci vittis binis obscurioribus latis et dentatis notata, subtiliter coriaceus, pilis brevibus flavis parce vestitus. Oculi antici sat magni, inter se subæquales, in lineam rectam, medii a lateralibus quam inter se duplo remotiores. Oculi postici paulo minores, in lineam vix procurvam, medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Area mediorum paulo latior quam longior et postice quam antice paulo latior. Chelæ validæ, ad basin geniculatæ, fuscæ, leviter rugatæ, marginibus sulci longis et obliquis, inferiore, in parte basali, dentibus remotis binis minutissimis munito. Partes oris sternumque fusco-rufula, hoc subtiliter coriaceum, postice longe acuminatum. Abdomen angustum nigrum. Pedes flavidi, femoribus anticis valde infuscatis. Pedes antici reliquis multo longiores, femoribus intus, in parte apicali, aculeis seriatis trinis longis, tibiis aculeis inferioribus parvis 4-4 aculeisque lateralibus similibus, metatarsis aculeis 2-2, basalibus longioribus, aculeisque apicalibus minutissimis, armatis. Pedes-maxillares graciles, fusi, femore patellaque luteis; tibia patella longiore, tereti et curvata, apophysi brevi et conica ad apicem armata; tarsò tibia multo longiore, cylindrato, in parte apicali longe inflexo, supra sulcato et piloso; bulbo complicato, ad basin lamina angusta valde recurva, ad apicem lamina magna, membranacea et securiformi insigniter munita. — Maevatanana (Decorse, 1901).

**Copa lineata**, nov. sp. — ♀ (pullus) long. 6 millimètres.

Cephalothorax ovatus, fronte angusta, luteo-testaceus, pilis plumosis albidis vestitus, tenuiter fusco-marginalius et lineis binis fuscis incurvis, antice postice que convergentibus, notatus. Area oculorum nigra. Oculi ordinarii. Clypeus setis ereclis quatuor, medianis longioribus, munitus. Abdomen breviter ovatum, atrum, albido-pubescentia. Chelæ, partes oris pedesque pallide fulvo-testacea, femoribus tibiisque, ad radicem aculeorum, fusco-maculatis. Pedes valde aculeati. — Madagascar (Bastard 1897).

**Rhitymna fasciolata**, nov. sp. — ♂ long. 16 millimètres.

Cephalothorax rufescens, crebre albo-pubescentia sed vitta frontali nigra et fere glabra antice marginatus. Oculi medii antici lateralibus paulo majores et a lateralibus quam inter se saltem duplo remotiores. Abdomen breviter oblongum, fulvum, crebre albido-luteo-pubescentia. Chelæ valide, nigrae, opaceæ, parce nigro albidoque crinitæ, margine inferiore sulci dentibus validis trinis denteque ultimo parvo, instructo. Partes oris castaneæ. Sternum pedesque fulva, albido-pubescentia et longe hirsuta, metatarsis tarsisque anticis valde infuscatis, aculeis

ordinariis. Pedes-maxillares fulvo-rufuli, femore dilutiore; tibia patella paulo breviore, apophysi apicali nigra, crassa, inflexa, supra profunde sulcata, apice oblique secta, cum angulo inferiore producto atque acuto, extus armata; tarse ovato; bulbo ovato, simplici. — Amborombe (Decorse, 1901); Ambolisitra (G. Grandidier, VII, 1898).

**Platyoides Grandidieri**, nov. sp. — ♀ long. 10-12 millimètres.

Cephalothorax fusco-castaneus, opacus, valde impressus. Oculi medii antici lateralibus evidenter minores, a lateralibus quam inter se plus triplo remotiores, a sese spatio oculo paulo minore distantes. Oculi medii postici anticis paulo minores, plani albi et oblique triquetri. Oculi laterales utrinque sat magni æqui. Chelæ validæ, convexæ et divaricatae, fere nigræ, nitidæ, intus parce et longe crinitæ, margine superiore sulci dentibus binis parvis æquis, a sese remotis, munito. Sternum pedesque pallide fusco-rufula, metatarsis tarsisque obscurioribus. Pedes haud aculeati, intus sat longe pilosi. Plaga genitalis paulo longior quam latior, fere parallela, nitida, fulva, postice infuscata. — Madagascar (Grandidier, 1895); Andrahomana (C. Alluaud, VIII, 1900).

**Cœlossia trituberculata**, nov. sp. — ♀. long. 3 millimètres.

Cephalothorax rubro-castaneus, valde coriaceus, parte cephalica antice declivi et attenuata, sulco lato profundo et obliquo utrinque discreta, tuberculo medii minutissimo et postice tuberculis binis geminatis vix majoribus ornata. Oculi medii vix prominuli, inter se subæquales, aream subquadratam et subverticalem occupantes. Abdomen magnum, latius quam longius, antice sinuoso-arcuatum, postice late rotundum, fulvum, area dorsali magna nigrina notatum, utrinque tuberculis obtusis rufulis et nitidis binis, antice sigillis magnis et ovatis trinis, in medio sigillis minoribus quatuor, aream latiorem quam longiorem et antice quam postice angustiorem occupantibus, notatum. Sternum fusco-rufulum, coriacum, utrinque valde impressum. Pedes fulvo-rufuli apice dilutiores, tibiis anticis, leviter depresso et curvatis, metatarsisque setis spiniformibus erectis numerosis et uniseriatis intus armatis. — Im Mauricia : Curepipe (Ch. Alluaud, 1900).

A *C. aciculata*, E. Sim. imprimis differt oculis mediis vix prominulsi et parte cephalica tuberculis parvis trinis munita (in *C. aciculata* tuberculo longo et erecto munita).

**Pycnacantha fuscosa**, nov. sp. — ♂. long. 5 millimètres.

Cephalothorax nigricans, valde testacco-variegatus, parce fulvo-pilosus, subtiter rugosus et utrinque granulis nigris majoribus paucis conspersus, parte thoracica late sulcata, cephalica angusta, antice sensim acliui, fronte angusta, in medio prominula et obtusa, utrinque tuberculo longo subacuto, postice ad basin oculos laterales gerente, insigniter armata, regione clypei alta lutea. Abdomen breve, altius quam longius, cinereum, postice in declivitate macula maxima, acute triquetra nigra et albo-limbata fere omnino obiectum, in declivitate antice convexum et tuberculis acutis (superne albis, inferne nigris) armatum, medianis binis et utrinque 6 vel 7 fere inordinatis et inter se iniquis, apice tuberculis binis longissimis erectis et leviter divaricatis, gracilibus sed apice paululum ampliatis et

furcatis, insigniter armatum, in declivitate postice verticale plano, in medio mucro, ad marginem, præsertim ad angulum inferiorem, tuberculis parvis et acutis paucis munitum. Chelæ debiles et sat longæ, fulvo-variatae. Partes oris nigrae, testaceo-marginatae. Sternum planum, minute et parce rugosum, atrum, antice vitta transversa, utrinque macula parva, postice macula majore triquetra fulvis, ornatum. Pedes cinereo-albidi, nigricanti-punctati et variegati, femoribus antice subtus nigro-vittatis, inter se valde inæquales, quatuor antice longi, femoribus robustis, leviter compressis, superne tuberibus humilibus paucis (3 vel 4) nodosis, inferne spinis brevibus et erectis paucis biseriatis armatis, patellis deplanatis utrinque leviter ampliatis et inæqualibus, tibiis muticis, longis, gracilibus et curvatis, superne deplanatis, metatarsis muticis et curvatis tibiis brevioribus. Pedes-maxillares mediocres nigri; tibia subquadrata, convexa; tarso angusto, ad basin convexo et extus apophysi testacea parva et curvata munito, ad apicem longe producto incurvo et gracili; bulbo fulvo-testaceo, ovato, magno sed simplici. — Madagascar : Androhomana (Ch. Alluaud, VIII, 1900).

**Cyphalonotus columnifer**, nov. sp. — ♀. long. 5 millimètres.

Cephalothorax fulvo-testaceus, parte cephalica late infuscata, thoracica tenuiter fusco-marginata. Oculi medii inter se subæquales, aream verticalem paulo latiorem quam longiorem et antice quam postice vix latiorem occupantes. Abdomen breve sed altissimum, in tuberculum erectum, cylindraceum, corpore toto saltem duplo longius, insigniter productum, subacutum atque in parte apicali mucronibus parvis plurimis, fere inordinatis, munitum, cinereo-testaceum, supra antice macula magna nigra notatum, subtus nigrum, mammillæ nigrae. Chelæ fulvae, apice infuscatae. Partes oris olivaceæ. Sternum nigrum opacum. Pedes obscure fulvo-olivacei, femoribus dilutoribus et luteis sed apice annulo nigro lato notatis. Pedes quatuor antice reliquis multo longiores, tibiis gracilibus, curvatis et longissimis, metatarsis multo brevioribus et curvatis, parce aculeatis. — Madagascar : Andrahomana (Ch. Alluaud, VIII, 1900).

---

*SUR LE PRÉTENDU GENRE SAVIGNYARCA JOUSSEAUME (LAMELLIBRANCHE),  
PAR M. ED. LAMY.*

Dans le genre *Arca* L., où on rencontre fréquemment des individus plus ou moins déformés, les conchyliologistes ont eu malheureusement tendance à multiplier les coupes, en prenant souvent un spécimen quelque peu aberrant comme type d'une nouvelle subdivision, à laquelle ils attribuent une valeur de section ou de sous-genre, parfois même une importance générique. C'est ainsi qu'en 1891 M. le docteur Jousseaume a décrit, sous le nom de *Savignyarca savignyarca*<sup>(1)</sup>, une coquille d'Aden, qui, d'après lui, ne se

<sup>(1)</sup> M. le docteur Jousseaume, qui cite le genre *Savignyarca* dans ses « Réflexions sur la faune malacologique de la mer Rouge » (*Ann. Sc. Nat. Zool.*, 7<sup>e</sup> série, t. XII, 1892), en a décrit la coquille dans *le Naturaliste*, 13<sup>e</sup> année, 2<sup>e</sup> série, 1891, p. 222.